

## ЛЕКЦИЯ 2

### Простейший случай теоремы Пикара

#### § 5. Простейший случай теоремы Пикара:

#### автономное уравнение с глобально липшицевой правой частью

**Теорема 1.** Пусть  $B$  — банахово пространство с нормой  $\|\cdot\|$ . Пусть функция  $\Phi : B \rightarrow B$  определена на всём пространстве  $B$  и липшиц-непрерывна, т. е. существует такое число  $L > 0$ , что при всех  $x_1, x_2 \in B$  верно неравенство

$$\|\Phi(x_1) - \Phi(x_2)\| \leq L\|x_1 - x_2\|.^1$$

Тогда задача Коши (при любых  $t_0 \in \mathbb{R}$ ,  $x_0 \in B$ )

$$\begin{cases} \frac{d}{dt}x = \Phi(x), & t \geq t_0; \\ x(t_0) = x_0 \end{cases} \quad (1)$$

глобально и однозначно разрешима, т. е.

1) её решение  $x(t) \in C^1([t_0, +\infty); B)$  существует;

2) каково бы ни было другое решение  $\tilde{x}(t)$  задачи Коши (1) на промежутке  $\mathcal{T} = [t_0, T]$  ( $t_0 < T < +\infty$ ) или  $\mathcal{T} = [t_0, T)$  ( $t_0 < T \leq +\infty$ ), оно совпадает с  $x(t)$  на  $\mathcal{T} \cap [t_0, +\infty)$ . (Здесь и далее в очевидных случаях подразумеваются односторонние производные.)

Доказательству теоремы предпослём две леммы.

**Лемма 1.** Зафиксируем некоторое  $h \leq \frac{1}{2L}$ . Каковы бы ни были  $t_1 \geq t_0$  и  $x_1 \in B$ , существует и единственно решение задачи Коши

$$\begin{cases} \frac{d}{dt}x = \Phi(x), & t \in [t_1, t_1 + h]; \\ x(t_1) = x_1. \end{cases} \quad (2)$$

*Доказательство.* Запишем абстрактное интегральное уравнение Вольтерра

$$x(t) = x_1 + \int_{t_1}^t \Phi(x(\tau)) d\tau. \quad (3)$$

Докажем прежде, что утверждения

(А)  $\langle x(t) \in C^1([t_1, t_1 + h]; B)$  и  $x(t)$  является решением задачи Коши (2)»

и

(Б)  $\langle x(t) \in C([t_1, t_1 + h]; B)$  и  $x(t)$  является решением интегрального уравнения (3)»

<sup>1</sup>Очевидно, липшиц-непрерывная функция является непрерывной — это нам вскоре понадобится.

равносильны.

(А)  $\implies$  (Б). Заметим, что если производная функции  $x(t)$  непрерывна на отрезке  $[t_1, t_1 + h]$ , то (в силу уравнения (2)) непрерывна на нём и правая часть уравнения — сложная функция  $x \mapsto \Phi(x(t))$ . Следовательно, обе части уравнения (2) можно проинтегрировать по  $t$  в пределах от  $t_1$  до произвольной точки на отрезке  $[t_1, t_1 + h]$ :

$$\int_{t_1}^t x'(\tau) d\tau = \int_{t_1}^t \Phi(x(\tau)) d\tau, \quad t \in [t_1, t_1 + h].$$

Применяя далее к левой части формулу Ньютона—Лейбница, получаем

$$x(t) - x(t_1) = \int_{t_1}^t \Phi(x(\tau)) d\tau, \quad t \in [t_1, t_1 + h],$$

что с учётом равенства  $x(t_1) = x_1$  из (2) совпадает с (3).

(Б)  $\implies$  (А). Поскольку функция  $x(t)$  непрерывна на отрезке  $[t_1, t_1 + h]$ , то и функция  $t \mapsto \Phi(x(t))$  — как композиция непрерывных функций  $x(t)$  и  $\Phi(x)$  — тоже непрерывна на нём. Следовательно, к правой части интегрального уравнения (3) можно применить теорему о производной интеграла с переменным верхним пределом. Получаем равенство

$$x'(t) = \Phi(x(t)), \quad t \in [t_1, t_1 + h], \quad (4)$$

а при подстановке в интегральное уравнение значения  $t = t_1$  получаем начальное условие. При этом в силу равенства (4) производная  $x'(t)$  тоже непрерывна на отрезке  $[t_1, t_1 + h]$ .

Следовательно, для доказательства существования и единственности непрерывно дифференцируемого решения задачи Коши (2) достаточно доказать существование и единственность решения интегрального уравнения (3)<sup>2</sup>.

Для доказательства существования и единственности решения интегрального уравнения (3) введём банахово пространство (см. задачу 1)

$$\mathbb{B} = C([t_1, t_1 + h]; B)$$

с нормой

$$\|x\|_{\mathbb{B}} = \sup_{t \in [t_1, t_1 + h]} \|x(t)\|$$

и оператор (вообще говоря, нелинейный)  $A : \mathbb{B} \rightarrow \mathbb{B}$ , действующий по правилу

$$(Ax)(t) = x_1 + \int_{t_1}^t \Phi(x(\tau)) d\tau,$$

с помощью которого уравнение (3) переписывается в виде

$$x = Ax. \quad (5)$$

---

<sup>2</sup>Подчёркнём, что из существования и единственности решения одного уравнения следует не только существование, но и единственность решения другого!

Заметим, что этот оператор (определённый на всём банаховом пространстве  $B$ ) является сжимающим. В самом деле, для любых непрерывных функций  $\tilde{x}(t)$ ,  $\tilde{\tilde{x}}(t)$  в любой точке  $t \in [t_1, t_1 + h]$  имеем

$$\begin{aligned} \|A\tilde{x}(t) - A\tilde{\tilde{x}}(t)\| &= \left\| x_1 + \int_{t_1}^t \Phi(\tilde{x}(\tau)) d\tau - x_1 - \int_{t_1}^t \Phi(\tilde{\tilde{x}}(\tau)) d\tau \right\| = \left\| \int_{t_1}^t (\Phi(\tilde{x}(\tau)) - \Phi(\tilde{\tilde{x}}(\tau))) d\tau \right\| \leq \\ &\leq \int_{t_1}^t \|\Phi(\tilde{x}(\tau)) - \Phi(\tilde{\tilde{x}}(\tau))\| d\tau \leq \int_{t_1}^t L \|\tilde{x}(\tau) - \tilde{\tilde{x}}(\tau)\| d\tau \leq \int_{t_1}^t L \sup_{t \in [t_1, t_1 + h]} \|\tilde{x} - \tilde{\tilde{x}}\| d\tau = \\ &= \int_{t_1}^t L \|\tilde{x} - \tilde{\tilde{x}}\|_{\mathbb{B}} d\tau \leq |t - t_1| L \|\tilde{x} - \tilde{\tilde{x}}\|_{\mathbb{B}} \leq Lh \|\tilde{x} - \tilde{\tilde{x}}\|_{\mathbb{B}} \leq \frac{1}{2} \|\tilde{x} - \tilde{\tilde{x}}\|_{\mathbb{B}}. \end{aligned}$$

Беря точную верхнюю грань по всем  $t \in [t_1, t_1 + h]$ , получаем

$$\|A\tilde{x}(t) - A\tilde{\tilde{x}}(t)\|_{\mathbb{B}} \leq \frac{1}{2} \|\tilde{x} - \tilde{\tilde{x}}\|_{\mathbb{B}}, \quad (6)$$

т. е. оператор  $A$  является сжимающим оператором, действующим на всём пространстве  $\mathbb{B}$ . Следовательно, к нему применим принцип сжимающих отображений (теорема о неподвижной точке), что и доказывает существование и единственность решения интегрального уравнения (3) и — в силу вышесказанного — аналогичный результат для задачи Коши (2).  $\blacktriangle$

**Лемма 2.** Если  $x_1(t)$  и  $x_2(t)$  — соответственно решения задачи Коши (1) на некоторых промежутках  $\mathcal{T}_1$  и  $\mathcal{T}_2$  с началом в точке  $t_0$  ( $t_0 \in \mathcal{T}_1, \mathcal{T}_2$ ), то эти функции совпадают на  $\mathcal{T}_1 \cap \mathcal{T}_2$ .

*Доказательство.* Для сокращения записи введём обозначение  $\mathcal{T}_3 = \mathcal{T}_1 \cap \mathcal{T}_2$ . Рассмотрим множество

$$\mathcal{T}_4 = \{t \in \mathcal{T}_3 \mid x_1(t) \neq x_2(t)\}.$$

Если оно пусто, то лемма доказана. Предположим теперь, что  $\mathcal{T}_4$  непусто. Заметим, что это множество открыто в метрическом пространстве  $\mathcal{T}_4$  как прообраз открытого множества  $(0, +\infty)$  при непрерывном отображении  $g(t) := \|x_1(t) - x_2(t)\|$ . Положим

$$T = \inf \mathcal{T}_4. \quad (7)$$

Докажем, что  $T \notin \mathcal{T}_4$ , т. е.  $x_1(T) = x_2(T)$ . В самом деле, если  $T = 0$ , то это следует из определения решений (точнее, из начального условия задачи Коши (1)). Если же  $T > 0$ , то в любой левой полуокрестности есть точки, не принадлежащие  $\mathcal{T}_4$ , а в любой правой полуокрестности — точки, принадлежащие ему. Следовательно,  $T$  является граничной точкой множества  $\mathcal{T}_4$  и поэтому не принадлежит этому открытому множеству.

Из только что установленного факта  $T \notin \mathcal{T}_4$  и предположении о непустоте  $\mathcal{T}_4$  следует, в частности, что  $\mathcal{T}_3$  «не может заканчиваться» точкой  $T$  и содержит некоторый промежуток  $[T, T + h_1]$ . Тогда можно выбрать достаточно малый отрезок  $[T, T + h]$  (где  $h \leq \min(h_1, \frac{1}{2L})$ ) и поставить на нём задачу Коши

$$\begin{cases} \frac{d}{dt}x = \Phi(x), & t \in [t_1, t_1 + h]; \\ x(T) = x_1(T). \end{cases} \quad (8)$$

Ограничения каждой из функций  $x_1(t)$ ,  $x_2(t)$ , очевидно, были бы её решениями, но не совпадали бы тождественно на отрезке  $[T, T + h]$  (поскольку  $T$  есть *точная* нижняя грань  $\mathcal{T}_4$ ). Последнее противоречит лемме 1.  $\blacktriangle$

*Доказательство теоремы.* Теперь утверждение теоремы следует из доказанных выше двух лемм. В силу леммы 1 можно, двигаясь по шагам длины  $h$ , «составить» решение задачи Коши (1) из решений задач типа (2). При этом в силу равенства  $x'(t) = \Phi(x(t))$ , верного и в граничных точках отрезков для соответствующих односторонних производных, и непрерывности функции  $x(t)$  (а следовательно, и сложной функции  $\Phi(x(t))$ ), мы получаем, что производная в точках «сшивки» тоже существует и непрерывна. Из леммы 2 мы получаем утверждение о единственности решения.  $\blacktriangle$

## § 6. Пример применения теоремы

Рассмотрим обобщенное уравнение Колмогорова–Петровского–Пискунова (ОКПП)

$$\frac{\partial}{\partial t}(\varepsilon^4 \Delta u - \varepsilon^2 u) + k\varepsilon^2 \Delta u - f(u, x, \varepsilon) = 0$$

с начальными и граничными условиями

$$u(x, 0) = u_0(x), \quad x \in \Omega; \quad u|_{\partial\Omega \times (0, T)} = 0.$$

Пусть оператор  $\mathbb{D}$  действует на трижды дифференцируемую функцию  $u$  по правилу

$$\mathbb{D}u = (\varepsilon^4 \Delta u - \varepsilon^2 u)_t + \varepsilon^2 k \Delta u - f(u, x), \quad (9)$$

где непрерывная функция  $f(u, x)$  удовлетворяет условию

$$f(0, x) = 0$$

для всех  $x \in \Omega$  и условию Липшица

$$|f(u_1, x) - f(u_2, x)| \leq C|u_1 - u_2| \quad (10)$$

для любых  $x \in \Omega$ ,  $u_{1,2} \in \mathbb{R}^1$ , где  $C > 0$  – постоянная величина.

В качестве примера мы рассмотрим функцию  $f$  такую, что

$$f(u, x) = \begin{cases} \gamma u(u^2 - U^2(x)), & |u| \leq U_0, \quad x \in D, \\ (3\gamma U_0^2 - \gamma U^2(x))u - 2\gamma U_0^3, & |u| \geq U_0. \end{cases} \quad (11)$$

где  $U_0 > \max_{\Omega} |U(x)|$ .

Рассмотрим начально-краевую задачу для обобщённого уравнения Колмогорова–Петровского–Пискунова (ОКПП)

$$\begin{cases} \mathbb{D}u = 0, & x \in \Omega, t \geq 0 \\ u(x, t) = 0, & x \in \partial\Omega, t \geq 0 \\ u(x, 0) = u_0(x), & x \in \partial\Omega \end{cases} \quad (12)$$

в ограниченной области  $\Omega \subset \mathbb{R}^3$  с границей  $\partial\Omega \in \mathbb{C}^{(2,\delta)}$ ,  $\delta \in (0, 1]$ .

Скалярное произведение и норму в  $\mathbb{L}^2(\Omega)$  будем обозначать соответственно через  $(u, v)_2$  и  $\|u\|_2$ , а скалярное произведение и норму в  $\mathbb{H}_0^1(\Omega)$  — соответствующими символами без индексов.

Чтобы сформулировать обобщённую постановку задачи (12), удобно будет сразу ввести некоторые операторы.

Определим оператор  $\mathbb{J} : \mathbb{H}_0^1(\Omega) \rightarrow \mathbb{H}^{-1}(\Omega)$  действующим по правилу

$$\langle \mathbb{J}v, w \rangle = \int_{\Omega} vw \, dx \quad \forall v, w \in \mathbb{H}_0^1(\Omega).$$

Очевидно, это линейный оператор. Оценим его норму. Имеем

$$|\langle \mathbb{J}v, w \rangle| = \left| \int_{\Omega} vw \, dx \right| \leq \|v\|_2 \|w\|_2 \leq C_F^2 \|v\| \|w\|, \quad (13)$$

где  $C_F$  — константа в неравенстве Фридрихса

$$\|w\|_2 \leq C_F \|w\| \quad \forall w \in \mathbb{H}_0^1(\Omega)$$

для области  $\Omega$ . Из (13) имеем

$$\|\mathbb{J}\| \leq C_F^2. \quad (14)$$

Далее, введём оператор  $\Delta : \mathbb{H}_0^1(\Omega) \rightarrow \mathbb{H}^{-1}(\Omega)$  по правилу

$$\langle \Delta v, w \rangle = - \int_{\Omega} (\nabla v, \nabla w) \, dx \quad \forall v, w \in \mathbb{H}_0^1(\Omega).$$

В силу оценки

$$\left| \int_{\Omega} (\nabla v, \nabla w) \, dx \right| \equiv |(\nabla v, \nabla w)| \leq \|v\| \|w\|$$

имеем

$$\|\Delta\| \leq 1 \quad (15)$$

(на самом деле эта норма равна 1, как показывает выбор  $w = v$ , но для нас это не принципиально).

Наконец, введём нелинейный оператор  $\mathbb{F}$  по правилу  $\mathbb{F}(v) = f(v(x), x)$ .

Справедлива следующая лемма:

**Лемма 3.** Оператор  $\mathbb{F}(v)$  является липшиц-непрерывным оператором, действующим в  $\mathbb{L}^p(\Omega)$  (при любом  $p > 1$ ), с константой Липшица, равной  $C$  из формулы (10).

*Доказательство.* Поскольку  $|U(x)| < U_0 < +\infty$ , из (11) следует оценка (с некоторыми константами  $C_1, C_2$ , не зависящими от  $x$ )

$$|f(v, x)| \leq C_1 + C_2 |v|,$$

откуда в силу теоремы Красносельского об операторе Немыцкого следует, что оператор  $v \mapsto \mathbb{F}(v)$  переводит функцию, принадлежащую  $\mathbb{L}^p(\Omega)$ , в функцию, принадлежащую  $\mathbb{L}^p(\Omega)$ . Далее, имеем оценку

$$\begin{aligned} \|\mathbb{F}(v_1) - \mathbb{F}(v_2)\|_p &= \left( \int_{\Omega} |f(v_1, x) - f(v_2, x)|^p dx \right)^{1/p} \leq \{(10)\} \leq \\ &\leq \left( \int_{\Omega} C^p |v_1 - v_2|^p dx \right)^{1/p} = C \|v_1 - v_2\|_p, \end{aligned}$$

что и доказывает лемму.  $\blacktriangle$

Мы зафиксируем  $p = 2$  и будем считать, что  $\mathbb{F} : \mathbb{L}^2(\Omega) \rightarrow \mathbb{L}^2(\Omega)$ .

Введём также операторы вложения  $\mathbb{J}_1 : \mathbb{H}_0^1(\Omega) \rightarrow \mathbb{L}^2(\Omega)$  (действующий естественным образом) и  $\mathbb{J}_2 : \mathbb{L}^2(\Omega) \rightarrow \mathbb{H}^{-1}(\Omega)$ , действующий по правилу

$$\langle \mathbb{J}_2 v, w \rangle = \int_{\Omega} v w dx \quad \forall v, w \in \mathbb{H}_0^1(\Omega).$$

Оценим их нормы. Очевидно,  $\|\mathbb{J}_1\| = C_F$  по самому определению константы Фридрихса. Далее,

$$|\langle \mathbb{J}_2 v, w \rangle| = |(v, w)_2| \leq \|v\|_2 \|w\|_2 \leq C_F \|v\|_2 \|w\|,$$

откуда сразу следует, что  $\|\mathbb{J}_1\| \leq C_F$ .

*Замечание 1.* Очевидно, что  $\mathbb{J} = \mathbb{J}_2 \mathbb{J}_1$ .

Теперь мы можем строго определить оператор  $\mathbb{D}$ . Именно, для всякого  $v(x) \equiv v(x, t) \in \mathbb{C}^1([0, T]; \mathbb{H}_0^1(\Omega))$  или  $v(x) \equiv v(x, t) \in \mathbb{C}^1([0, T]; \mathbb{H}_0^1(\Omega))$  (где  $T > 0$  произвольно и во втором случае может быть равно  $+\infty$ ) положим

$$\mathbb{D}(v) = \frac{d}{dt}(\varepsilon^4 \Delta v - \varepsilon^2 \mathbb{J}v) + \varepsilon^2 k \Delta v - \mathbb{J}_2 \mathbb{F}(\mathbb{J}_1 v), \quad (16)$$

где  $\frac{d}{dt}$  обозначает дифференцирование в смысле предела по норме  $\mathbb{H}^{-1}(\Omega)$ :

$$\frac{d}{dt} v(t) = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{1}{\Delta t} (v(t + \Delta t) - v(t)).$$

Очевидно,

$$\mathbb{D} : \mathbb{C}^1([0, T]; \mathbb{H}_0^1(\Omega)) \rightarrow \mathbb{C}([0, T]; \mathbb{H}^{-1}(\Omega)).$$

Теперь мы можем дать определение обобщённого решения задачи (12).

**Определение 1.** Обобщённым решением задачи (12) будем называть функцию  $u(x, t) \equiv u(x)(t)$  из класса  $\mathbb{C}^{(1)}([0, T]; \mathbb{H}_0^1(\Omega))$ , где  $0 < T < +\infty$  (или из класса  $\mathbb{C}^{(1)}([0, T]; \mathbb{H}_0^1(\Omega))$ , где  $0 < T \leq +\infty$ ), удовлетворяющую условиям

$$\begin{cases} \mathbb{D}(u) = 0, & t \in [0, T] \quad (\text{соответственно } t \in [0, T)), \\ u(0) = u_0(x) \in \mathbb{H}_0^1(\Omega). \end{cases} \quad (17)$$

Как показывает «интегрирование по частям», классическое решение задачи (12), если оно существует, удовлетворяет нашему определению обобщённого решения.

*Замечание 2.* Здесь 0 есть нулевой элемент пространства  $\mathbb{H}^{-1}(\Omega)$ , т. е. задачу (17) можно переписать так:

$$\begin{cases} \forall w \in \mathbb{H}_0^1(\Omega) \quad \langle \mathbb{D}(u), w \rangle = 0, & t \in [0, T] \quad (\text{соответственно } t \in [0, T]), \\ u(0) = u_0(x) \in \mathbb{H}_0^1(\Omega). \end{cases}$$

Оказывается, задача (17) может быть переформулирована в виде абстрактной задачи Коши. Для этого нам понадобится некоторая подготовительная работа.

Прежде всего введём линейный оператор

$$\mathbb{A} \equiv \mathbb{J} - \varepsilon^2 \Delta : \mathbb{H}_0^1(\Omega) \rightarrow \mathbb{H}^{-1}(\Omega),$$

В силу доказанной ранее ограниченности операторов  $\mathbb{J}$  и  $\Delta$  и оценок их норм сразу получаем:  $\|\mathbb{A}\| \leq C_F^2 + \varepsilon^2$ . Итак, доказана

**Лемма 4.** Оператор  $\mathbb{A} : \mathbb{H}_0^1(\Omega) \rightarrow \mathbb{H}^{-1}(\Omega)$  является ограниченным линейным оператором с нормой  $\|\mathbb{A}\| \leq C_F^2 + \varepsilon^2$ .

Напомним некоторые определения.

**Определение 2.** Пусть  $X$  – вещественное банахово пространство,  $X^*$  – его сопряженное. Оператор  $\mathbb{A} : X \rightarrow X^*$  называется радиально непрерывным, если для любых фиксированных  $v_1, v_2 \in X$  вещественнозначная функция  $S(s)$ , заданная равенством  $S(s) = \langle \mathbb{A}(v_1 + sv_2), v_2 \rangle$ , непрерывна на отрезке  $[0, 1]$ .

**Следствие из леммы 4.** Оператор  $\mathbb{A}$  является радиально непрерывным. Действительно,  $|S(s_1) - S(s_2)| \leq \|\mathbb{A}\| \|v_2\|^2 |s_1 - s_2|$ .

Напомним определение сильно монотонного оператора.

**Определение 3.** Оператор  $\mathbb{A} : X \rightarrow X^*$  называется сильно монотонным (с константой  $m > 0$ ), если для любых  $v_1, v_2 \in X$  существует такое  $m > 0$ , что

$$\langle \mathbb{A}v_1 - \mathbb{A}v_2, v_1 - v_2 \rangle \geq m \|v_1 - v_2\|^2.$$

**Лемма 5.** Оператор  $\mathbb{A}$  является сильно монотонным.

*Доказательство.* Имеем

$$\begin{aligned} \langle \mathbb{A}v_1 - \mathbb{A}v_2, v_1 - v_2 \rangle &= \langle \mathbb{A}(v_1 - v_2), v_1 - v_2 \rangle = \\ &= \|v_1 - v_2\|_2^2 + \varepsilon^2 \|\nabla(v_1 - v_2)\|_2^2 \geq \varepsilon^2 \|\nabla(v_1 - v_2)\|_2^2 = \varepsilon^2 \|v_1 - v_2\|^2. \end{aligned} \quad (18)$$

▲

Напомним определение коэрцитивного оператора.

**Определение 4.** Оператор  $\mathbb{A} : X \rightarrow X^*$  называется коэрцитивным, если существует вещественнозначная функция  $\gamma(s) > 0$ , заданная на множестве  $s \in [0, +\infty)$ , такая, что

$$\langle \mathbb{A}v, v \rangle \geq \|v\| \gamma(\|v\|) \quad \forall v \in X,$$

где  $\lim_{s \rightarrow +\infty} \gamma(s) = +\infty$ .

**Лемма 6.** Оператор  $\mathbb{A}$  является коэрцитивным.

*Доказательство.* Имеем

$$\langle \mathbb{A}v, v \rangle = \|v\|_2^2 + \varepsilon^2 \|\nabla v\|_2^2 \geq \varepsilon^2 \|\nabla v\|_2^2 = \varepsilon^2 \|v\|^2.$$

Следовательно, оператор  $\mathbb{A}$  является коэрцитивным с  $\gamma(s) = \varepsilon^2 s$ .  $\blacktriangle$

Итак, оператор  $\mathbb{A}$  является радиально непрерывным, строго монотонным, коэрцитивным.

**Лемма 7.** Оператор  $\mathbb{A}$  имеет обратный оператор

$$\mathbb{A}^{-1} : \mathbb{H}^{-1}(\Omega) \rightarrow \mathbb{H}_0^1(\Omega).$$

*Доказательство.* Так как оператор  $\mathbb{A}$  является радиально непрерывным, строго монотонным, коэрцитивным, то утверждение леммы вытекает из теоремы Браудера.  $\blacktriangle$

**Лемма 8.** Оператор  $\mathbb{A}^{-1}$  является липшиц-непрерывным с постоянной Липшица, равной  $1/\varepsilon^2$ .

*Доказательство.* Заметим, что в силу определения нормы на сопряжённом пространстве  $X^*$

$$\|f\|_{X^*} \geq \frac{|\langle f, g \rangle|}{\|g\|_X}. \quad (19)$$

Пусть  $w_1, w_2 \in H^{-1}(\Omega)$ ,  $v_1 = \mathbb{A}^{-1}w_1$ ,  $v_2 = \mathbb{A}^{-1}w_2$ . Тогда  $w_1 = \mathbb{A}v_1$ ,  $w_2 = \mathbb{A}v_2$  и с учётом (19), а также неравенства (18), полученного при доказательстве леммы 5, имеем

$$\|w_1 - w_2\|_{\mathbb{H}^{-1}(\Omega)} = \|\mathbb{A}v_1 - \mathbb{A}v_2\|_{\mathbb{H}^{-1}(\Omega)} \geq \frac{|\langle \mathbb{A}v_1 - \mathbb{A}v_2, v_1 - v_2 \rangle|}{\|v_1 - v_2\|} \geq \varepsilon^2 \|v_1 - v_2\| = \varepsilon^2 \|\mathbb{A}^{-1}w_1 - \mathbb{A}^{-1}w_2\|,$$

где в силу обратимости операторов  $\mathbb{A}$  и  $\mathbb{A}^{-1}$   $v_1 \neq v_2$  тогда и только тогда, когда  $w_1 \neq w_2$ . Итак, при всех  $v_1 \neq v_2$  имеем

$$\|\mathbb{A}^{-1}w_1 - \mathbb{A}^{-1}w_2\| \leq \frac{1}{\varepsilon^2} \|w_1 - w_2\|_{\mathbb{H}^{-1}(\Omega)}.$$

$\blacktriangle$

Теперь обобщённая постановка, данная в определении 1, может быть переписана в виде

$$\begin{cases} \varepsilon^2 \frac{d}{dt}(\mathbb{A}u) = \varepsilon^2 k \Delta u - \mathbb{J}_2 \mathbb{F}(\mathbb{J}_1 u), \\ u(0) = u_0 \in \mathbb{H}_0^1(\Omega). \end{cases} \quad (20)$$

В силу свойств гладкости решения по  $t$  операторы  $\frac{d}{dt}$  и  $\mathbb{A}$  коммутируют, и мы можем записать (после деления на  $\varepsilon^2$ )

$$\begin{cases} \mathbb{A} \frac{d}{dt}(u) = k \Delta u - \frac{1}{\varepsilon^2} \mathbb{J}_2 \mathbb{F}(\mathbb{J}_1 u), \\ u(0) = u_0 \in \mathbb{H}_0^1(\Omega). \end{cases} \quad (21)$$



Наконец, пользуясь ранее доказанной непрерывной обратимостью оператора  $\mathbb{A}$ , мы можем преобразовать задачу к виду

$$\begin{cases} \frac{d}{dt}(u) = \mathbb{A}^{-1} \left( k\Delta u - \frac{1}{\varepsilon^2} \mathbb{J}_2 \mathbb{F}(\mathbb{J}_1 u) \right), \\ u(0) = u_0 \in \mathbb{H}_0^1(\Omega). \end{cases} \quad (22)$$

Обозначим оператор, стоящий в правой части, через  $\Phi(u)$ . Таким образом,  $\Phi : \mathbb{H}_0^1(\Omega) \rightarrow \mathbb{H}_0^1(\Omega)$  — это оператор, действующий по правилу

$$\Phi(v) = \mathbb{A}^{-1} \left( k\Delta v - \frac{1}{\varepsilon^2} \mathbb{J}_2 \mathbb{F}(\mathbb{J}_1 v) \right). \quad (23)$$

Очевидно, этот (нелинейный) оператор является липшиц-непрерывным. В самом деле, оператор  $\mathbb{A}^{-1}\Delta : \mathbb{H}_0^1(\Omega) \rightarrow \mathbb{H}_0^1(\Omega)$  является ограниченным линейным оператором в силу вышесказанного; оператор  $\mathbb{A}^{-1} \circ \mathbb{J}_2 \circ \mathbb{F} \circ \mathbb{J}_1$  липшиц-непрерывен как композиция непрерывных линейных операторов  $\mathbb{A}^{-1}$ ,  $\mathbb{J}_i$ ,  $i = 1, 2$ , и липшиц-непрерывного оператора  $\mathbb{F}$ .

Итак, исходная задача (в обобщённой постановке) приведена к виду абстрактной задачи Коши

$$\begin{cases} \frac{d}{dt}u = \Phi(u), \\ u(0) = u_0 \in \mathbb{H}_0^1(\Omega) \end{cases} \quad (24)$$

с липшиц-непрерывной правой частью.

В силу теоремы предыдущего параграфа абстрактная задача Коши (24) глобально разрешима, т. е. существует единственное решение  $u(t) \in \mathcal{C}([0, +\infty); \mathbb{H}_0^1(\Omega))$ , а любое другое решение (на конечном промежутке  $\mathcal{T}$ ) является его ограничением с промежутка  $[0, +\infty)$  на промежуток  $\mathcal{T}$ .

### Задачи для самостоятельного решения

1. Доказать, что линейное пространство  $C([0, T]; B)$  действительно является банаховым.
2. Конкретизировать рассуждение о «сшивке» решений, полученных на отрезках, которыми мы пользовались в конце доказательства теоремы.
- 3\*. Сформулировать и доказать теорему о глобальной разрешимости системы линейной однородной системы линейных дифференциальных уравнений.