

Лекция 6
**ВЕКТОРНЫЕ ТОПОЛОГИЧЕСКИЕ
ПРОСТРАНСТВА**

§ 1. Линейные функционалы

Напомним некоторые понятия линейной алгебры. Пусть \mathcal{L} — это линейное пространство над полем K вещественных либо комплексных чисел.

Рассмотрим множество всех линейных функционалов над линейным пространством \mathcal{L} .

Определение 1. *Линейным функционалом f над линейным пространством \mathcal{L} называется произвольное линейное отображение:*

$$f : \mathcal{L} \rightarrow \mathbb{K}, f(\alpha_1 x_1 + \alpha_2 x_2) = \alpha_1 f(x_1) + \alpha_2 f(x_2), x_1, x_2 \in \mathcal{L}, \alpha_1, \alpha_2 \in \mathbb{K}.$$




Рис. 1. Скобки двойственности.

Ясно, что это множество, которое мы обозначим через

$$\mathcal{L}^\#,$$

также является линейным пространством над тем же полем, если положить

$$(\alpha_1 f_1 + \alpha_2 f_2)(x) \stackrel{\text{def}}{=} \alpha_1 f_1(x) + \alpha_2 f_2(x). \quad (1.1)$$

Введем в рассмотрение так называемые скобки двойственности.

Вместо того, чтобы обозначать действие линейного функционала $f \in \mathcal{L}^\#$ на элементе $x \in \mathcal{L}$ как $f(x)$, нам удобно ввести следующее новое обозначение:

$$\langle f, x \rangle : \mathcal{L}^\# \otimes \mathcal{L} \rightarrow \mathbb{C}^1 \quad \text{или} \quad \mathbb{R}^1.$$

Отметим, что скобка двойственности $\langle f, x \rangle$ является билинейным функционалом своих аргументов.

□ Действительно, это следствие того, что

1. Функционал $f \in \mathcal{L}^\#$ является линейной функцией на линейном пространстве \mathcal{L} , что в старых обозначениях записывается как

$$f(\alpha_1 x_1 + \alpha_2 x_2) = \alpha_1 f(x_1) + \alpha_2 f(x_2), \quad x_1, x_2 \in \mathcal{L}, \quad \alpha_1, \alpha_2 \in \mathbb{K}.$$

2. С учетом определения (1.1) линейные функционалы $\mathcal{L}^\#$ сами образуют линейное пространство. □

Возникает вопрос о существовании линейных функционалов и о размерности этого пространства. В конечномерном случае справедлива следующая теорема:

*Теорема 1. Пусть \mathcal{L}_n — n -мерное линейное пространство с базисом $\{e_i\}_{i=1}^n$. Тогда пространство $\mathcal{L}_n^\#$ тоже n -мерно и возможный базис этого пространства определяется следующими линейными функционалами $\{e^{*j}\}_{j=1}^n$:*

$$\langle e^{*j}, e_i \rangle := \delta_i^j. \quad (1.2)$$

Доказательство.

1. Прежде всего заметим, что формулы (1.2) действительно задают линейные функционалы. Итак,

$$\langle e^{*j}, x \rangle = x^j, \quad x = x^i e_i,$$

$$\langle e^{*j}, \alpha_1 x_1 + \alpha_2 x_2 \rangle = \alpha_1 x_1^j + \alpha_2 x_2^j = \alpha_1 \langle e^{*j}, x_1 \rangle + \alpha_2 \langle e^{*j}, x_2 \rangle.$$

2. Докажем, теперь, что набор линейных функционалов $\{e^{*j}\}$ образует базис пространства $\mathcal{L}_n^\#$.

Действительно, докажем линейную независимость. Пусть $\{\beta_j\}_{j=1}^n$ — произвольный набор комплексных чисел. Тогда

$$\beta_j e^{*j} = \vartheta^* \Leftrightarrow 0 = \langle \beta_j e^{*j}, e_i \rangle = \beta_i, \quad i = \overline{1, n}.$$

Теперь докажем, что это максимальный набор линейно независимых линейных функционалов. Предположим, что существует еще один линейный функционал e^{*0} , линейно независимый вместе с набором $\{e^{*j}\}_{j=1}^n$.

Рассмотрим следующее выражение:

$$x = x^i e_i, \quad \langle e^{*0}, x \rangle = \gamma_i x^i, \quad \gamma_i = \langle e^{*0}, e_i \rangle,$$

$$c_0 e^{*0} + \sum_{j=1}^n c_j e^{*j} \Rightarrow \left\langle c_0 e^{*0} + \sum_{j=1}^n c_j e^{*j}, x \right\rangle = 0,$$

$$(c_0 \gamma_i + c_i) x^i = 0 \quad \text{для всех} \quad \{x^i\}_{i=1}^n \Rightarrow c_0 = -\frac{c_i}{\gamma_i}.$$

Следовательно, набор функционалов $\{e^{*0}, e^{*j}\}_{j=1}^n$ является линейно зависимым.

Наше предположение неверно.
Теорема доказана.

§ 2. Определение векторного топологического пространства (ВТП)

Начнем со следующего определения.

Определение 2. Векторное пространство X над полем комплексных чисел \mathbb{C} , на котором задана топология τ , называется векторным топологическим пространством (X, τ) , если операции сложения элементов и умножения на число являются непрерывными отображениями из $(X, \tau) \times (X, \tau)$ в (X, τ) .

Рассмотрим поподробнее это определение. Прежде всего отметим, что можно ввести понятие декартова произведения топологических пространств $(X_1, \tau_1) \times (X_2, \tau_2)$ как топологическое пространство (X, τ) , где

$$X = X_1 \times X_2, \quad \tau = \tau_1 \times \tau_2,$$

$$X = \{x = (x_1, x_2) : x_1 \in X_1, x_2 \in X_2\},$$

$$\tau = \tau_1 \times \tau_2 = \{(U_1, U_2) : U_1 \in \tau_1, U_2 \in \tau_2\}.$$

Требуется расшифровки непрерывность отображения

$$F_1(x, y) : (X, \tau) \times (X, \tau) \rightarrow (X, \tau), \quad (2.1)$$

задаваемое как $F_1(x, y) = x + y$, а также непрерывность отображения

$$F_2(\lambda, x) : (\mathbb{C}^1, d(z_1, z_2) = |z_1 - z_2|) \times (X, \tau) \rightarrow (X, \tau), \quad (2.2)$$

задаваемое как $F_2(\lambda, x) = \lambda \cdot x$.

1. Непрерывность $F_1(x, y)$ означает, что для всякой окрестности V_{x+y} точки $x + y$ найдутся такие окрестности U_x и U_y , что $F_1(U_x, U_y) = U_x + U_y \subset V_{x+y}$.

2. Непрерывность отображения $F_2(\lambda, x)$ означает, что для любой окрестности точки $V_{\lambda \cdot x}$ найдутся такие окрестности $U_\lambda = \{\mu \in \mathbb{C} : |\mu - \lambda| < \varepsilon\}$ и U_x точек $\lambda \in \mathbb{C}^1$ и $x \in X$ соответственно, что $F_2(U_\lambda, U_x) = \mu U_x \subset V_{\lambda \cdot x}$ при всех $\mu \in U_\lambda$.

ПРИМЕР 1. Метрическое пространство $(\mathbb{R}^1, d(x, y) = |x - y|)$ является векторным топологическим над полем \mathbb{R}^1 . Докажем, что выполнены условия непрерывности отображений $F_1(x, y)$ и $F_2(\lambda, x)$.

□ Непрерывность $F_1(x, y)$. Действительно, непрерывность по Коши в данном случае эквивалентна непрерывности по Хайне. Пусть

$$x_n \xrightarrow{d} x, \quad y_m \xrightarrow{d} y,$$

$$d(F_1(x_n, y_m), F_1(x, y)) = |x_n - x - y + y_m| \leq |x - x_n| + |y - y_m| \rightarrow +0$$

при $n \rightarrow +\infty$ и при $m \rightarrow +\infty$. \square

□ Непрерывность $F_2(x, y)$. Действительно, пусть

$$\lambda_n \rightarrow \lambda, \quad x_m \xrightarrow{d} x \Rightarrow$$

$$\begin{aligned} \Rightarrow d_0(F_2(\lambda_n, x_m), F_2(\lambda, x)) &\stackrel{\text{def}}{=} |\lambda_n x_m - \lambda x| \leq \\ &\leq |\lambda_n - \lambda| |x_m| + \lambda |x_m - x| \rightarrow +0 \end{aligned}$$

при $n \rightarrow +\infty$ и $m \rightarrow +\infty$. \square

ПРИМЕР 2. Метрическое пространство $L(X, \mu)$ классов интегрируемых по Лебегу измеримых функций относительно метрики

$$d(\{f\}, \{g\}) = \int_X |f(x) - g(x)| d\mu$$

является векторным топологическим над полем \mathbb{R}^1 .

□ Непрерывность $F_1(\{f\}, \{g\})$. Действительно, пусть

$$\{f_n(x)\} \xrightarrow{d} \{f(x)\}, \quad \{g_m(x)\} \xrightarrow{d} \{g(x)\},$$

$$\begin{aligned} d(F_1(\{f\}, \{g\}), F_1(\{f_n\}, \{g_m\})) &= \\ &= d(\{f\} + \{g\} - \{f_n\} - \{g_m\}) = \\ &= \int_X |f(x) + g(x) - f_n(x) - g_m(x)| d\mu \leq \\ &\leq \int_X |f(x) - f_n(x)| d\mu + \int_X |g(x) - g_m(x)| d\mu \rightarrow +0 \end{aligned}$$

при $n, m \rightarrow +\infty$. \square

□ Непрерывность $F_2(\lambda, \{f\})$. Действительно, пусть

$$\{f_m\} \xrightarrow{d} \{f(x)\}, \quad \lambda_n \rightarrow \lambda,$$

$$d_0(F_2(\lambda, \{f\}), F_2(\lambda_n, \{f_m\})) = \int_X |\lambda_n f_m(x) - \lambda f(x)| d\mu \rightarrow +0$$

при $m \rightarrow +\infty$ и $n \rightarrow +\infty$. \square

Справедлива следующая важная лемма:

Лемма 1. Топология τ_x в точке $x \in X$ ВТП (X, τ) может быть представлена в следующем виде:

$$\tau_x = \{x + V_\vartheta, \quad V_\vartheta \in \tau_\vartheta\},$$

3. Выпуклые, уравновешенные, ограниченные и поглощающие множества 5

где τ_ϑ — это топология нулевого элемента $\vartheta \in X$.

Доказательство.




Рис. 2. Инвариантность топологии относительно сдвига.

Достаточно доказать, что для любой окрестности $U_x \in \tau_x$ точки $x \in X$ найдется такая окрестность нуля $V_\vartheta \in \tau_\vartheta$, что

$$U_x = x + V_\vartheta.$$

□ Действительно, пусть $U_x \in \tau_x$. Докажем, что

$$V_\vartheta \stackrel{\text{def}}{=} U_x - x \in \tau_\vartheta.$$

1. Прежде всего понятно, что $\vartheta \in V_\vartheta$, поскольку $x \in U_x$.

2. Пусть $y \in V_\vartheta$, тогда согласно определению этого множества найдется такое $z \in U_x$, что $y = z - x$. Согласно свойству топологии τ ВТП (X, τ) отображение

$$z \stackrel{\text{def}}{=} x + y$$

непрерывно в точке y . Тогда для этой окрестности $U_x \ni z$ найдется такая окрестность $W_y \in \tau_y$ точки y , что

$$x + W_y \subset U_x \Rightarrow W_y \subset U_x - x = V_\vartheta \Rightarrow V_\vartheta \in \tau_\vartheta. \quad \square$$

Теорема доказана.

§ 3. Выпуклые, уравновешенные, ограниченные и поглощающие множества

Дадим определение выпуклого множества.

Определение 3. Выпуклым множеством E в векторном пространстве X называется такое множество, что для всех пар точек $x, y \in E$ и для всякого $\lambda \in [0, 1]$ имеем $\lambda x + (1 - \lambda)y \in E$.

ПРИМЕР 3. Примером выпуклого множества является, например, множество $\{x \in X : \|x - x_0\| < d_0\}$ в нормированном пространстве $(X, \|\cdot\|)$.

□ Действительно, имеет место следующее неравенство:

$$\begin{aligned} \|\lambda x + (1 - \lambda)y - (1 - \lambda + \lambda)x_0\| &\leq \\ &\leq \|\lambda x - \lambda x_0\| + \|(1 - \lambda)y - (1 - \lambda)x_0\| \leq \end{aligned}$$

$$\leq \lambda \|x - x_0\| + (1 - \lambda) \|y - x_0\| < \lambda d_0 + (1 - \lambda) d_0 = d_0. \quad \square$$





Рис. 3. Выпуклое и не выпуклое множества.

Дадим определение уравновешенного множества.

Определение 4. Множество E в векторном пространстве X называется уравновешенным, если для всякого $\lambda \in \mathbb{C}$ с $|\lambda| \leq 1$ имеем $\lambda E \subset E$.

ПРИМЕР 4. Уравновешенным множеством в нормированном пространстве $(X, \|\cdot\|)$ является множество $\{x \in X : \|x - x_0\| < d_0\}$, поскольку

$$\|\lambda(x - x_0)\| = |\lambda| \|x - x_0\| \leq \|x - x_0\| < d_0 \quad \text{при} \quad |\lambda| \leq 1.$$

Рис. 4. Уравновешенные множества в \mathbb{R}^2 при $\lambda \in [-1, 1]$.

Замечание 1. Оба этих определения даны для произвольного линейного пространства. Следующие определения существенно используют понятие ВТП (векторного топологического пространства).

Определение 5. Множество E в векторном топологическом пространстве (X, τ) называется ограниченным, если для всякой окрестности нуля U_ϑ найдется такое $s > 0$, что $E \subset tU_\vartheta$ при $t > s$.

Замечание 2. Иначе говоря, любая окрестность нуля в ВТП поглощает ограниченное множество.

Лемма 2. Множество $\{x\} \in X$ является ограниченным множеством в любом векторном топологическом пространстве (X, τ) .

Доказательство.

Заметим, что по определению ВТП (X, τ) имеем функция

$$F_2(\lambda, x) = \lambda x : \mathbb{C} \times (X, \tau) \rightarrow (X, \tau)$$




Рис. 5. Ограниченное множество E .

непрерывна, в частности, в точке $(0, x)$. Заметим, что

$$F_2(0, x) = 0 \cdot x = \vartheta \in X.$$

Поэтому согласно определению по Коши имеем для любой окрестности $U_\vartheta \in \tau$ точки ϑ найдется такое $\varepsilon > 0$, что для всех $0 < \lambda < \varepsilon$ имеем

$$\lambda x \in U_\vartheta \Rightarrow x \in \frac{1}{\lambda} U_\vartheta.$$

Теперь введем обозначение

$$s = \frac{1}{\varepsilon} \quad \text{и} \quad t = \frac{1}{\lambda} \Rightarrow t > s.$$

Лемма доказана.

ПРИМЕР 5. Конечное семейство точек $\{x_1, \dots, x_n\} \subset X$ тоже является ограниченным множеством. Действительно, для каждой окрестности нуля $U_\vartheta \in \tau$ найдутся такие $s_i > 0$, что для всех $t > s_i$ имеем $x_i \in tU_\vartheta$. Поэтому при $t > s := \max\{s_1, \dots, s_n\}$ имеем

$$\bigcup_{i=1}^n \{x_i\} \subset tU_\vartheta.$$




Рис. 6. Конечное число точек — ограниченное множество.

Дадим определение поглощающего множества.

Определение 6. Множество E в векторном топологическом пространстве (X, τ) называется поглощающим, если для всякой точки $x \in X$ найдется такое $t = t(x) > 0$, что $x \in t \cdot E$.

ПРИМЕР 6. Например, каждая окрестность нуля является поглощающим множеством, поскольку по доказанному точка ограниченное множество.

Дадим определение абсолютно выпуклого множества.

Определение 7. Выпуклое и уравновешенное множество E векторного топологического пространства (X, τ) называется абсолютно выпуклым.

ПРИМЕР 7. Окрестность $\|x - x_0\| < \varepsilon$ является абсолютно выпуклым множеством в нормированном пространстве $(X, \|\cdot\|)$.

§ 4. Пространство линейных и непрерывных функционалов над ВТП (X, τ)

Дадим определение.

Определение 8. Множество всех линейных непрерывных функционалов над векторным топологическим пространством (X, τ) называется сопряженным пространством и обозначается как X^* .

Замечание 3. Напомним, что это означает. Пусть $f \in X^\#$, тогда непрерывность этого функционала в точке $x \in X$ определяется следующим образом: для всякой окрестности $U(f(x)) = \{\mu \in \mathbb{C} : |\mu - f(x)| < \varepsilon\}$ найдется такая окрестность $U(x)$ точки $x \in X$, что имеет место вложение $f(U(x)) \subset U(f(x))$. При этом линейный функционал $f(x)$ должен быть непрерывен в каждой точке векторного топологического пространства (X, τ) .

ПРИМЕР 8. Рассмотрим следующий функционал

$$\langle I, f \rangle \stackrel{\text{def}}{=} \int_X f(x) d\mu : L(X, \mu) \rightarrow \mathbb{R}^1.$$

Докажем, что он принадлежит $L^*(X, \mu)$.

1. Линейность функционала I следует из линейности интеграла Лебега.

2. Непрерывность в топологии нормированного пространства $L(X, \mu)$ вытекает из оценки

$$|\langle I, f \rangle - \langle I, f_0 \rangle| \leq \int_X |f(x) - f_0(x)| d\mu < \varepsilon$$

для любой ε -окрестности точки $\{f_0(x)\}$, которая имеет следующий вид:

$$\left\{ \{f(x)\} \in L(X, \mu) : \|\{f(x)\} - \{f_0(x)\}\| = \int_{\tilde{X}} |f(x) - f_0(x)| d\mu < \varepsilon \right\}.$$

§ 5. Полунормы и функционал Минковского

Топологию векторного топологического пространства (X, τ) можно задавать различными способами, но нас будет интересовать один частный, но важный случай, когда топология задается при помощи *полунорм*.

Прежде всего дадим определение полунормы.

Определение 9. *Вещественная функция $p(x) : X \rightarrow \mathbb{R}_+^1$, определенная на векторном пространстве X , называется полунормой, если выполнены следующие два условия:*

- (i) $p(\lambda x) = |\lambda|p(x)$ для всех $\lambda \in \mathbb{C}$ и всех $x \in X$;
- (ii) $p(x + y) \leq p(x) + p(y)$ для всех $x, y \in X$.

ПРИМЕР 9. Рассмотрим следующую вещественную функцию на линейном пространстве $\mathbb{C}^{(1)}([0, 1])$:

$$p(f) = \sup_{x \in [0, 1]} |f'(x)|.$$

Ясно, что эта функция удовлетворяет всем условиям полунормы. Однако, из условия, что $p(f) = 0$ вытекает всего лишь на всего, что $f(x) = \text{const}$.

Определение 10. *Функционалом Минковского $p_A(x)$ абсолютно выпуклого и поглощающего множества $A \subset X$ в векторном топологическом пространстве (X, τ) называется следующая функция:*

$$p_A(x) := \inf \{ \lambda \in \mathbb{R}_+^1 : x \in \lambda \cdot A \}. \quad (5.1)$$




Рис. 7. Функционал Минковского.

Теорема 2. *Функционал Минковского — полунорма.*

Доказательство.

Шаг 1. Докажем свойство (i).

□ Действительно, пусть $\alpha > 0$, тогда имеют место следующие соотношения:

$$\begin{aligned} p_A(\alpha x) &= \inf \{ \lambda : \lambda > 0, \alpha x \in \lambda A \} = \\ &= \alpha \inf \{ \alpha^{-1} \lambda : \lambda > 0, x \in \alpha^{-1} \lambda A \} = \alpha \inf \{ \bar{\lambda} : \bar{\lambda} > 0, x \in \bar{\lambda} A \} = \\ &= \alpha p_A(x). \quad \square \end{aligned}$$

Рассмотрим теперь случай $\alpha < 0$.

□ В этом случае справедливы аналогичные соотношения в силу уравновешенности множества A

$$\begin{aligned} p_A(\alpha x) &= \inf \{ \lambda : \lambda > 0, \alpha x \in \lambda A \} = \\ &= -\alpha \inf \{ -\alpha^{-1} \lambda : \lambda > 0, x \in -\alpha^{-1} \lambda A \} = \\ &= -\alpha \inf \{ \bar{\lambda} : \bar{\lambda} > 0, x \in \bar{\lambda} A \} = -\alpha p_A(x). \quad \square \end{aligned}$$

Случай $\alpha = 0$ очевиден.

2. Докажем теперь справедливость свойства (ii). Пусть $x, y \in X$, тогда выберем числа a и b следующим образом:

$$p_A(x) < a < p_A(x) + \varepsilon, \quad p_A(y) < b < p_A(y) + \varepsilon \quad \text{при } \varepsilon > 0. \quad (5.2)$$

Докажем теперь, что

$$\frac{x}{a}, \frac{y}{b} \in A.$$

□ Действительно, по определению чисел a, b и в силу результата шага 1 имеем

$$1 > p_A\left(\frac{x}{a}\right) = \inf \left\{ \lambda : \lambda > 0, \frac{x}{a} \in \lambda A \right\},$$

значит, при некотором $\lambda \in (0, 1)$ имеет место вложение

$$\frac{x}{a} \in \lambda A \subset A$$

в силу уравновешенности множества A .

Аналогично доказывается, что

$$\frac{y}{b} \in A.$$

Но множество A выпуклое поэтому оно вместе с точками

$$\frac{x}{a} \quad \text{и} \quad \frac{y}{b}$$

содержит и отрезок, их соединяющий, т. е., в частности, точку

$$\frac{a}{a+b} \frac{x}{a} + \frac{b}{a+b} \frac{y}{b} = \frac{x+y}{a+b} \in A. \quad (5.3)$$

Значит, в силу определения функционала Минковского из (5.3) имеем

$$p_A(x + y) = \inf \{ \lambda : \lambda > 0, x + y \in \lambda A \} \quad \text{при } \lambda \leq a + b.$$

Стало быть, отсюда и из (5.2) имеем неравенство

$$p_A(x + y) \leq a + b = p_A(x) + \varepsilon + p_A(y) + \varepsilon.$$

Откуда в силу произвольности $\varepsilon > 0$ приходим к выводу о справедливости свойства (ii). \square

Теорема доказана.

Теперь мы можем доказать теорему о связи функционала Минковского и абсолютно выпуклых поглощающих множеств ВТП.

Теорема 3. Пусть $p(x)$ — это полунорма на векторном топологическом пространстве (X, τ) , тогда следующие множества являются абсолютно выпуклыми и поглощающими:

$$A \stackrel{\text{def}}{=} \{x \in X : p(x) < \alpha\} \quad \text{и} \quad B \stackrel{\text{def}}{=} \{x \in X : p(x) \leq \alpha\} \quad \text{при } \alpha > 0.$$

Обратно, пусть $A \subset X$ — это абсолютно выпуклое и поглощающее множество, тогда справедливы вложения

$$\{x : p_A(x) < 1\} \subset A \subset \{x : p_A(x) \leq 1\}.$$

Доказательство.

Шаг 1. Докажем, что множества A и B абсолютно выпуклые и поглощающие.

\square Действительно, рассмотрим, например, множество A . Проверим его *выпуклость*: пусть $x, y \in A$, тогда в силу свойства (ii) имеет место следующее неравенство:

$$p(tx + (1 - t)y) \leq tp(x) + (1 - t)p(y) < t\alpha + (1 - t)\alpha = \alpha.$$

Уравновешенность этого множества следует из свойства (i). Действительно, имеем

$$p(\lambda x) = |\lambda|p(x) \leq p(x) < \alpha.$$

Таким образом, приходим к выводу, что A абсолютно выпуклое множество.

Докажем теперь, что это множество является *поглощающим*. Действительно, пусть $y \in X$. Введем обозначение

$$\lambda(y) \stackrel{\text{def}}{=} \frac{p(y)}{\alpha},$$

тогда получим, что для всех $\lambda > \lambda(y)$ имеют место неравенства

$$p(y) < \lambda\alpha, \quad p\left(\frac{y}{\lambda}\right) < \alpha \Rightarrow \frac{y}{\lambda} \in A \Rightarrow y \in \lambda A.$$

Аналогичные рассуждения справедливы для множества B . \square

Осталось доказать последнее утверждение теоремы. Пусть

$$x \in \left\{ x \in X : p_A(x) \stackrel{\text{def}}{=} \inf \{ \lambda : \lambda > 0, x \in \lambda A \} < 1 \right\},$$

значит, $x \in \lambda A$ при некотором $\lambda \in (0, 1)$, тогда из уравновешенности множества A получаем

$$x \in \lambda A \subset A \Rightarrow \{x : p_A(x) < 1\} \subset A.$$

Стало быть, первое вложение доказано.

Пусть теперь $x \in A$. Тогда имеем $x \in \lambda A$ при некотором $\lambda \in (0, 1]$ в силу уравновешенности. Значит,

$$x \in A \Rightarrow x \in \left\{ x \in X : p_A(x) \stackrel{\text{def}}{=} \inf \{ \lambda : \lambda > 0, x \in \lambda A \} \leq 1 \right\}.$$

Теорема доказана.

§ 6. Локально выпуклые пространства

Дадим определение *локально выпуклого пространства*.

Определение 11. *Векторное топологическое пространство (X, τ) называется локально выпуклым, если его базис окрестностей нуля \mathfrak{B}_0 может быть выбран, состоящим из выпуклых множеств.*

Важным свойством локально выпуклого векторного топологического пространства является то, что базис окрестностей нуля \mathfrak{B}_0 может быть выбран состоящим из абсолютно выпуклых окрестностей нуля.

Теорема 4. *В топологическом векторном пространстве (X, τ) :*

- (i) *каждая окрестность нуля содержит уравновешенную окрестность нуля;*
- (ii) *каждая выпуклая окрестность нуля содержит выпуклую уравновешенную окрестность нуля.*

Доказательство.

Шаг 1. Докажем свойство (i).

□ Действительно, пусть $U_\vartheta \in \tau_\vartheta$. Согласно определению топологии отображение

$$F_2(\lambda, \vartheta) = \lambda \cdot \vartheta = \vartheta - \text{непрерывно.}$$

Поэтому найдется такое $V_\vartheta \in \tau_\vartheta$ и такое $\varepsilon > 0$, что

$$\mu V_\vartheta \subset U_\vartheta \quad \text{при} \quad |\mu| < \varepsilon.$$

Тогда множество

$$W := \bigcup_{|\mu| < \varepsilon} \mu V_\vartheta \in \tau_\vartheta.$$

Докажем, что W уравновешенно.

$$\lambda W = \bigcup_{|\mu| < \varepsilon} \lambda \mu V_\vartheta \in \tau_\vartheta \subset \bigcup_{|\mu_1| < \varepsilon} \mu_1 V_\vartheta \in \tau_\vartheta = W,$$

так как

$$|\lambda\mu| \leq |\mu| < \varepsilon \quad \text{для всех } |\lambda| \leq 1. \quad \boxtimes$$

Шаг 2. Докажем свойство (ii). Пусть $U_\vartheta \in \tau_\vartheta$ выпукло.

1. Введем множество

$$A := \bigcap_{|\alpha|=1} \alpha U_\vartheta,$$

причем пусть в соответствии с результатом шага 1

$$\exists \varepsilon > 0, \exists V_\vartheta \in \tau_\vartheta, \quad \mu V_\vartheta \subset U_\vartheta, \quad |\mu| < \varepsilon \Rightarrow W = \bigcup_{|\mu| < \varepsilon} \mu V_\vartheta \in \tau_\vartheta,$$

причем окрестность $W \in \tau_\vartheta$ уравновешенна.

2. Имеет место вложение $W \subset A \Rightarrow W \subset \text{int } A$.

□ Прежде всего заметим, что в силу уравновешенности W

$$\lambda W \subset W \quad \text{при } |\lambda| = 1 \Rightarrow \frac{1}{\lambda} W \subset W \quad \text{т.к. } |1/\lambda| = 1/|\lambda| = 1.$$

Следовательно,

$$\frac{1}{\lambda} W \subset W \subset U_\vartheta \Rightarrow W \subset \lambda U_\vartheta \Rightarrow W \subset \bigcap_{|\lambda|=1} \lambda U_\vartheta = A. \quad \boxtimes$$

Следовательно, $\text{int } A \neq \emptyset$ и является окрестностью нуля.

3. Имеет место вложение $\text{int } A \subset U_\vartheta$.

□ Действительно,

$$\text{int } A = \text{int} \bigcap_{|\alpha|=1} \alpha U_\vartheta \subset \bigcap_{|\alpha|=1} \alpha \text{int } U_\vartheta = \bigcap_{|\alpha|=1} \alpha U_\vartheta \subset U_\vartheta,$$

поскольку при $\alpha = 1$ $\alpha U_\vartheta = U_\vartheta$ и поэтому имеет место последнее вложение. \boxtimes

4. Множество A выпукло и множество $\text{int } A$ выпукло.

□ Действительно, пусть $x, y \in A$, тогда

$$x, y \in \alpha U_\vartheta \quad \text{для всех } |\alpha| = 1 \Rightarrow$$

$$\begin{aligned} \Rightarrow \exists x_1, y_1 \in U_\vartheta, \quad x &= \alpha x_1, \quad y = \alpha y_1, \quad tx_1 + (1-t)y_1 \in U_\vartheta \Rightarrow \\ &\Rightarrow tx + (1-t)y \in \alpha U_\vartheta \Rightarrow tx + (1-t)y \in A. \quad \boxtimes \end{aligned}$$

Кроме того, со всяким выпуклым множеством A его внутренность $\text{int } A$ тоже выпукла.

□ Пусть $x, y \in \text{int } A \subset A$, тогда

$$tx + (1-t)y \in A \quad \text{при } t \in [0, 1].$$

В силу непрерывности функции $f(x, y) = tx + (1-t)y$ (по определению топологии ВТП) найдутся такие окрестности $U_x \in \tau_x$ и $U_y \in \tau_y$, что

$$tU_x + (1-t)U_y \subset \text{int } A \Rightarrow tx + (1-t)y \in \text{int } A. \quad \boxtimes$$

5. Множество A уравновешенно.

□ Действительно, пусть $\lambda = r\beta$ при $r \in [0, 1]$ и $|\beta| = 1$. Тогда

$$\lambda A = \bigcap_{|\alpha|=1} r\beta\alpha U_\vartheta = \bigcap_{|\beta\alpha|=1} r\beta\alpha U_\vartheta = \bigcap_{|\gamma|=1} r\gamma U_\vartheta.$$

С другой стороны, имеем $\vartheta \in \gamma U_\vartheta$ — выпуклое множество и поэтому

$$(1-r)\vartheta + r\gamma U_\vartheta \subset \gamma U_\vartheta \Rightarrow \bigcap_{|\gamma|=1} r\gamma U_\vartheta \subset \bigcap_{|\gamma|=1} \gamma U_\vartheta = A.$$

Итак,

$$\lambda A \subset A \quad \text{при} \quad |\lambda| = r|\beta| = r \leq 1. \quad \square$$

6. Со множеством A его внутренность $\text{int } A$ тоже уравновешенна.

□ Действительно,

$$\lambda A \subset A \quad \text{при} \quad |\lambda| \leq 1 \Rightarrow \text{int}(\lambda A) \subset \text{int } A \Rightarrow \lambda \text{int } A \subset \text{int } A. \quad \square$$

7. Итак, построенная окрестность $\text{int } A \in \tau_\vartheta$ является выпуклой и уравновешенной.

Теорема доказана.

§ 7. Локально выпуклые пространства. Построение с помощью полунорм

Начнем с процедуры построения базы топологии на основе произвольного семейства полунорм $P(X)$ на произвольном линейном пространстве X .

1. Введем окрестности нуля $\vartheta \in X$.

$$V(p, n) = \left\{ x : p(x) < \frac{1}{n} \right\} \quad \text{при} \quad p \in P(X) \quad \text{и} \quad n \in \mathbb{N}. \quad (7.1)$$

Действительно, $\vartheta \in V(p, n)$, поскольку $p(\vartheta) = 0$.

2. Базис топологии окрестностей нуля \mathfrak{B}_ϑ определим как всевозможные *конечные* пересечения

$$V_\alpha = \bigcap_{p \in \{p_1, p_2, \dots, p_m\}, n \in \{n_1, n_2, \dots, n_k\}} V(p, n), \quad \alpha = \{p_1, \dots, p_m; n_1, \dots, n_k\}.$$

3.1. либо произвольный элемент топологии τ_ϑ на линейном пространстве X определим исходя из определения базы топологии можно определить так

$$U_\vartheta = \bigcup_{\alpha} V_\alpha \in \tau.$$

3.2. либо произвольный элемент топологии τ_ϑ на линейном пространстве X определим исходя из определения ФСО топологии ν_ϑ как

$$U_\vartheta \in \tau_\vartheta : \forall x \in U_\vartheta \exists V(p, n) \in \nu_\vartheta, \quad x + V(p, n) \subset U_\vartheta.$$

Свойства окрестностей $V(p, n)$.

1. Заметим, что построенные окрестности нуля $V(p, n)$ являются выпуклыми множествами, т. е.

$$tV(p, n) + (1 - t)V(p, n) \subset V(p, n) \quad \text{при } t \in [0, 1].$$

□ Действительно, в силу свойств (i)–(ii) полунормы имеет место неравенство

$$\begin{aligned} p(tx + (1 - t)y) &\leq tp(x) + (1 - t)p(y) < \\ &< \frac{t}{n} + \frac{1 - t}{n} = \frac{1}{n} \quad \forall x, y \in V(p, n). \quad \square \end{aligned}$$

2. Кроме того, окрестности $V(p, n)$ являются *уравновешенными множествами*, т. е. $\alpha V(p, n) \subset V(p, n)$ при $|\alpha| \leq 1$. Это также следствие свойства (ii) полунормы.

□ Действительно, имеем при $0 < |\alpha| \leq 1$

$$p(\alpha x) = |\alpha|p(x) < \frac{|\alpha|}{n} \leq \frac{1}{n} \quad \text{для всех } x \in V(p, n). \quad \square$$

§ 8. Теорема о непрерывности полунорм

Справедлива следующая теорема:

Теорема 5. *Полунорма $p(x)$, определенная на векторном топологическом пространстве X , непрерывна в топологии τ тогда и только тогда, когда она непрерывна в нуле.*

Функционал Минковского $p_U(x)$ абсолютно выпуклого поглощающего множества $U \in X$ является непрерывным в топологии τ тогда и только тогда, когда U — окрестность нуля.

Доказательство.

Шаг 1. Докажем первую часть теоремы.

□ Пусть полунорма $p(x)$ непрерывна в нуле векторного топологического пространства (X, τ) . Тогда для любого $\varepsilon > 0$ найдется такое множество $U_\varepsilon \in \tau_\vartheta$, что имеют место выражения ¹⁾

$$|p(x) - p(\vartheta)| = p(x) < \varepsilon \quad \text{для всех } x \in U_\varepsilon.$$

В силу неравенства треугольника (ii) в определении полунормы для произвольного $a \in X$ имеем неравенство

$$|p(x) - p(a)| \leq p(x - a).$$

Поэтому для произвольного $\varepsilon > 0$ взяв указанное U_ε , получим неравенство

$$|p(x) - p(a)| \leq p(x - a) < \varepsilon \quad \text{для всех } x \in a + U_\varepsilon \setminus \{\vartheta\},$$

¹⁾ Заметим, что $p(x) \geq 0$ и $p(\vartheta) = 0$.

т. е. $p(x)$ непрерывна в произвольной точке $a \in X$. Утверждение в обратную сторону вытекает из того, что, в частности, полунорма непрерывна в нуле. \square

Шаг 2. Перейдем к доказательству второго утверждения теоремы.

1. Пусть $U \in X$ — абсолютно выпуклая окрестность нуля. Рассмотрим соответствующий функционал Минковского

$$p_U(x) \stackrel{\text{def}}{=} \inf \{ \lambda : \lambda > 0, x \in \lambda U \}.$$

Тогда для произвольного $\varepsilon > 0$ при $x \in \varepsilon U \stackrel{\text{def}}{=} U_\varepsilon$ имеем $\lambda \leq \varepsilon$ и, значит,

$$p_U(x) \leq \varepsilon \quad \text{для всех } x \in U_\varepsilon,$$

т. е. функционал Минковского $p_U(x)$ непрерывен в нуле и из предыдущего утверждения — на всем X .

2. Докажем обратное утверждение.

\square Действительно, пусть функционал Минковского абсолютно выпуклого, поглощающего множества $U \in X$ непрерывен в нуле. Тогда множество

$$A = \{x : p_U(x) \leq 1\}$$

замкнуто, т. е. принадлежит $X \setminus \tau$ как прообраз замкнутого множества $[0, 1]$. Граница ∂A этого множества имеет следующий вид:

$$\partial A = \overline{A} \cap (\overline{X \setminus A}) = \{x : p_U(x) = 1\} \Rightarrow \text{int } A = \{x : p_U(x) < 1\} \in \tau.$$

причем ясно, что $\vartheta \in \text{int } A$. \square

Теорема доказана.

Имеет место следующее важное утверждение, вытекающее из этой теоремы.

Лемма 3. Пусть $p(x)$ — это полунорма, определенная на векторном топологическом пространстве (X, τ) , тогда если множество $A_p \stackrel{\text{def}}{=} \{x : p(x) < 1\}$ содержит открытое множество $U \in \tau$ либо множество $B_p \stackrel{\text{def}}{=} \{x : p(x) \leq 1\}$ содержит открытое множество $U \in \tau$, то $p(x)$ непрерывна в топологии τ .

Доказательство.

Шаг 1. Пусть

$$\tau \ni U \in A_p = \{x : p(x) < 1\}.$$

Как мы уже доказали, по свойству полунорм множество A_p является абсолютно выпуклым и поглощающим. Поэтому

$$\frac{1}{2}x + \frac{1}{2}U \subset A_p, \quad -x \in U \Rightarrow V \stackrel{\text{def}}{=} -\frac{1}{2}x + \frac{1}{2}U \subset A_p, \quad V \in \tau, \quad V \neq \emptyset.$$

Следовательно,

$$V \subset \text{int } A_p \in \tau, \quad \text{int } A_p \neq \emptyset.$$

Как мы ранее доказали, вместе с множеством его внутренность обладает свойством абсолютной выпуклости. Кроме того, всякая окрестность нуля является поглощающим множеством.

Итак, $\text{int } A_p$ — абсолютно выпуклая окрестность нуля.

Шаг 2. Прежде всего заметим, что если $A \subset B$ — это абсолютно выпуклые и поглощающие множества, то соответствующие функционалы Минковского связаны неравенством

$$p_B(x) \leq p_A(x) \quad \text{при } A \subset B.$$

Шаг 3. Докажем теперь, что $p(x) \leq p_{A_p}(x)$.

□ Действительно, согласно определению функционала Минковского имеем

$$\begin{aligned} p_{A_p}(x) &= \inf\{\lambda > 0 : x \in \lambda A_p\} \Rightarrow \\ &\Rightarrow p\left(\frac{x}{\lambda}\right) < 1 \Rightarrow p(x) < \lambda \Rightarrow p(x) < p_{A_p}(x). \quad \square \end{aligned}$$

Шаг 4. Имеет место следующая цепочка неравенств:

$$p(x) < p_{A_p}(x) \leq p_{\text{int } A_p}(x).$$

Теперь согласно теореме 5 имеем функционал $p_{\text{int } A_p}(x)$ является непрерывным в нуле, поскольку множество $\text{int } A_p$ является абсолютно выпуклой окрестностью нуля. Стало быть, полунорма $p(x)$ тоже непрерывна в нуле, а значит, в силу теоремы 5 непрерывна на всем (X, τ) .

Лемма доказана.

Теорема 6. Полунорма $p(x)$, определенная на векторном топологическом пространстве (X, τ) , непрерывна в топологии τ , порожденной счетным семейством полунорм P , тогда и только тогда, когда найдется такие конечное семейство полунорм $p_i(x)$ из P при $i = \overline{1, n}$ и постоянная $\beta > 0$, что имеет место следующее неравенство:

$$p(x) \leq \beta \max_{i=\overline{1, n}} p_i(x). \quad (8.1)$$

Доказательство.

Докажем только достаточность условия (8.1). Пусть для полунормы $p(x)$ выполнено неравенство (8.1) при некотором конечном семействе полунорм $\{p_i(x)\} \subset P$. Поскольку топология τ порождена счетным семейством полунорм P , то множества

$$\begin{aligned} \{x : p_i(x) < 1\} &\in \tau \quad \text{для всех } i = \overline{1, n}, \\ \{x : p(x) < 1\} &\supset \{x : \beta \max_{i=\overline{1, n}} p_i(x) < 1\} \in \tau. \end{aligned}$$

Значит, в силу леммы 3 полунорма $p(x)$ непрерывна в топологии τ .

Теорема доказана.

Теорема 7. Базис окрестностей нуля \mathfrak{B}_ϑ (напоминаем, что это базис, построенный с помощью полунорм) на векторном простран-

стве X порождает локально выпуклое векторное топологическое пространство (X, τ) .

§ 9. Метризуемые ВТП

Векторное топологическое пространство при нашем его определении не является автоматически хаусдорфовым. Поэтому в дальнейшем мы будем строить только хаусдорфовы топологии. Заметим теперь, что, как мы уже говорили, из условия $p(x) = 0$ вовсе не вытекает, что $x = \vartheta$, однако есть одно свойство системы полунорм P , которое роднит семейство полунорм с нормой. Именно, относительно системы полунорм P мы будем требовать, чтобы она была *разделяющей*, т. е. для всякой точки $x \in X$ существует такая полунорма $p \in P$, что $p(x) \neq 0$.

Определение метризуемости. ВТП (X, τ) называется метризуемым относительно некоторой метрики $d(x, y)$, если система множеств

$$V_n(x) = \left\{ y \in X : d(x, y) < \frac{1}{n} \right\}$$

образуют ФСО v_x исходной топологии τ_x .

Справедлива следующая теорема о метризуемости.

Теорема 8. Пусть $P(X)$ есть счетное и разделяющее семейство полунорм, тогда построенное по этой системе полунорм локально выпуклое векторное топологическое пространство является метризуемым пространством.

Доказательство.

Предположим теперь, что наше семейство полунорм $P(X)$ счетное и разделяющее. Тогда на построенном топологическом пространстве (X, τ) можно ввести метрику

$$d(x, y) = d(x - y) \stackrel{\text{def}}{=} \sum_{k=1}^{+\infty} \frac{1}{2^k} \frac{p_k(x - y)}{1 + p_k(x - y)} \leq \min_{l \in \{n_1, \dots, n_m\}} p_l(x - y) \sum_{k=1}^{+\infty} \frac{1}{2^k}. \quad (9.1)$$

Проверим, что это метрика на (X, τ) .

1. Докажем, что $d(x, y) = 0 \Leftrightarrow x = y$.

□ Действительно, в силу того, что семейство полунорм является разделяющим, то $d(x, y) = 0$, тогда и только тогда, когда $x = y$, поскольку, если $d(x, y) = 0$, но $x - y \neq \vartheta$, то найдется такой номер $k = n_0$, что $p_{n_0}(x - y) > 0$, а значит, $d(x, y) > 0$. Противоречие.

2. Докажем неравенство треугольника

$$d(x, y) \leq d(x, z) + d(z, y), \quad x, y, z \in X.$$

Прежде всего заметим, что

$$f(p) = \frac{p}{1+p} \Rightarrow f'(p) = \frac{1}{(1+p)^2} > 0 \Rightarrow f(p) \leq f(p_1 + p_2) \text{ при } p \leq p_1 + p_2,$$

$$\frac{p}{1+p} \leq \frac{p_1+p_2}{1+p_1+p_2} \leq \frac{p_1}{1+p_1+p_2} + \frac{p_2}{1+p_1+p_2} \leq \frac{p_1}{1+p_1} + \frac{p_2}{1+p_2}.$$

отсюда и следует неравенство треугольника.

3. Докажем теперь, что метрика d порождает исходную топологию τ . В силу неравенства (9.1) мы приходим к выводу о том, что

$$\forall x \in U_{n_1, \dots, n_m} = \left\{ x \in X : d(x) \leq c_1 \min_{l \in \{n_1, \dots, n_m\}} p_l(x) < \frac{1}{n} \right\}$$

найдется окрестность

$$V_m(x) = \left\{ y \in X : d(x-y) < \frac{1}{m} \right\} \subset U_{n_1, \dots, n_m}, \quad d(x) = a < \frac{1}{n},$$

которую выберем из условия $m = 2n$ и неравенства для всех $y \in V_m(x)$

$$d(y) \leq d(y-x) + d(x) < \frac{1}{m} + a < \frac{1}{n} \quad \text{при достаточно большом } m \in \mathbb{N}.$$

Теорема доказана.

Дадим определение пространства Фреше.

Определение 12. Полное, метризуемое и локально выпуклое пространство называется пространством Фреше.

Замечание 4. Как видно из теоремы 8 — она не гарантирует того, что построенное по данной системе полунорм метрическое пространство является автоматически полным, т. е. пространством Фреше. Действительно, это не так и полноту построенного пространства надо проверять «вручную».

§ 10. Слабая, сильная и *-слабая топологии

Итак, пусть $f \in X^\#$, а $x \in X$, где X — это векторное пространство. Теперь рассмотрим следующую функцию на $x \in X$:

$$p(x) := |\langle f, x \rangle| \quad \text{для всех } x \in X \quad \text{при } f \in X^\#. \quad (10.1)$$

Докажем, что функция $p(x)$ — это полунорма.

□ Действительно, имеют место следующие очевидные неравенства:

$$p(x_1 + x_2) = |\langle f, x_1 + x_2 \rangle| = |\langle f, x_1 \rangle + \langle f, x_2 \rangle| \leq |\langle f, x_1 \rangle| + |\langle f, x_2 \rangle| = p(x_1) + p(x_2), \quad (10.2)$$

$$p(\lambda x) = |\langle f, \lambda x \rangle| = |\lambda \langle f, x \rangle| \leq |\lambda| |\langle f, x \rangle| = |\lambda| p(x). \quad \square \quad (10.3)$$

Таким образом, в силу (10.2) и (10.3) функция (10.1) является полунормой.

Пока у нас нет топологии в векторном пространстве $X^\#$, поэтому мы не можем сказать, что такое ограниченное множество в $X^\#$. Мы можем говорить только о конечных множествах из $X^\#$, т. е. о множествах, состоящих из конечного числа элементов из $X^\#$.

Таким образом, будем рассматривать произвольные конечные множества $A_n = \{f_1, f_2, \dots, f_n\} \subset X^\#$. Тогда определено семейство полунорм

$$P \stackrel{\text{def}}{=} \{p(x; A_n) : A_n \subset X^\#\}, \quad (10.4)$$

где

$$p(x; A_n) = \sup_{f \in A_n} |\langle f, x \rangle|.$$

Введем соответствующую ФСО точки $\vartheta \in X$

$$\nu_\vartheta = \{V_{nm} : n, m \in \mathbb{N}\}, \quad V_{nm} = \left\{x \in X : p(x; A_n) < \frac{1}{m}\right\}.$$

Это семейство согласно 7 параграфу порождает топологию τ_w на векторном пространстве X , которая называется *слабой топологией*.

З а м е ч а н и е 5. Заметим теперь, что выражение, которое стоит в левой части равенства (10.1) можно рассматривать как функцию от аргумента $f \in X^\#$ при фиксированном $x \in X$. Но тогда эта функция тоже полунорма, но уже на линейном пространстве $X^\#$.

Теперь введем следующее семейство полунорм:

$$P^\# \stackrel{\text{def}}{=} \{p(f; B_n) : B_n \subset X\}, \quad (10.5)$$

где

$$p(f; B_n) = \sup_{x \in B_n} |\langle f, x \rangle|, \quad B_n = \{x_1, x_2, \dots, x_n\} \subset X.$$

Введем соответствующее ФСО точки $\vartheta^* \in X^\#$

$$\nu_{\vartheta^*} = \{V_{nm} : n, m \in \mathbb{N}\}, \quad V_{nm} = \left\{x \in X : p(f; B_n) < \frac{1}{m}\right\}.$$

Это семейство согласно 7 параграфу порождает топологию τ_{w^*} , но уже на сопряженном векторном пространстве $X^\#$. Эта топология носит название **-слабой топологии*.

Возникает вопрос: почему мы в данном случае говорим не о слабой топологии, а о *-слабой топологии?


А вот почему — потому что на векторном пространстве $X^\#$ может быть еще задана и слабая топология следующим образом.

Поскольку множество $X^\#$ является векторным пространством, то на нем в свою очередь однозначно определено векторное пространство $X^{\#\#}$ линейных функционалов, но уже над $X^\#$. Определим соответствующие скобки двойственности между $X^\#$ и $X^{\#\#}$ следующим образом:

$$\langle x^\#, f \rangle_\# : X^{\#\#} \otimes X^\# \rightarrow \mathbb{C}. \quad (10.6)$$

Но тогда рассмотрим топологию на $X^\#$ при помощи следующего семейства полунорм:

$$P^{\#\#} \stackrel{\text{def}}{=} \{p^\#(f; A_n^\#) : A_n^\# \subset X^{\#\#}\}, \quad (10.7)$$

Рис. 8. Векторные пространства X , $X^{\#}$ и $X^{\#\#}$.

где

$$p^{\#}(f; A_n^{\#}) := \sup_{x^{\#} \in A_n^{\#}} |\langle x^{\#}, f \rangle_{\#}|,$$

где $A_n^{\#}$ — это произвольное конечное подмножество из $X^{\#\#}$. Введем соответствующее ФСО точки $\vartheta^* \in X^{\#}$

$$\nu_{\vartheta^*} = \{V_{nm}^{\#} : n, m \in \mathbb{N}\}, \quad V_{nm}^{\#} = \left\{ x \in X : p^{\#}(f; A_n^{\#}) < \frac{1}{m} \right\}.$$

Порожденная согласно 7 параграфу топология τ_w^* является по своему смыслу слабой топологией на $X^{\#}$, и эти две топологии τ_w^* и τ_w^{*} , вообще говоря, не совпадают.

Рассмотрим вопрос о том, когда эти две топологии являются эквивалентными. Заметим, что имеет место вложение (инъективное отображение)

$$J : X \rightarrow X^{\#\#}.$$

□ Действительно, это следствие того, что каждый элемент $x \in X$ порождает линейный функционал на $X^{\#}$ по формуле

$$\langle Jx, f \rangle_{\#} \stackrel{\text{def}}{=} \langle f, x \rangle.$$

Докажем линейность. Действительно,

$$\begin{aligned} \langle J(\alpha_1 x_1 + \alpha_2 x_2), f \rangle_{\#} &= \langle f, \alpha_1 x_1 + \alpha_2 x_2 \rangle = \\ &= \alpha_1 \langle f, x_1 \rangle + \alpha_2 \langle f, x_2 \rangle = \alpha_1 \langle Jx_1, f \rangle_{\#} + \alpha_2 \langle Jx_2, f \rangle_{\#}. \end{aligned}$$

Но вложение J может не быть сюръекцией, т. е. $J(X) = X^{\#\#}$.

Однако тот случай, когда все-таки такое вложение имеет место очень важен. В этом случае линейное пространство X называется *рефлексивным*.

И в этом случае имеет место равенство скобок двойственности

$$\langle f, x \rangle = \langle x^\#, f \rangle_\#,$$

причем каждому элементу $x \in X$ взаимно однозначно соответствует элемент $x^\# \in X^{\#\#}$. Поэтому из сравнения формул (10.8) и (10.7) мы приходим к выводу о том, что топологии τ_w и τ_w^* совпадают на $X^\#$. В общем случае, как нетрудно убедиться, топология τ_w^* состоит из большего числа множеств, чем топология τ_{w^*} и, значит, топология τ_w^* *сильнее* топологии τ_{w^*} на $X^\#$.

Теорема 9. *Топология τ_w^* сильнее топологии τ_{w^*} .*

Доказательство.

Рассмотрим стандартную окрестность нуля в ФСО ν_{ϑ^*} в $*$ -слабой топологии τ_{w^*} .

$$V_{n,m} = \left\{ f \in X^\# : p(f, B_n) < \frac{1}{m} \right\},$$

$$p(f; B_n) = \sup_{x \in B_n} |\langle f, x \rangle|, \quad B_n = \{x_1, x_2, \dots, x_n\} \subset X.$$

Но в силу естественного вложения

$$J(B_n) = \{x_1^* = Jx_1, \dots, x_n^* = Jx_n\}.$$

Поэтому имеем

$$V_{nm} = V_{nm}^\# = \left\{ x \in X : p^\#(f; J(B_n)) < \frac{1}{m} \right\} \in \tau_w^*,$$

поскольку по определению отображения J

$$\langle f, x \rangle = \langle Jx, f \rangle_\# \quad \text{для всех } x \in X, \quad f \in X^\#.$$

Теорема доказана.

Теперь мы займемся введением *сильной топологии* на пространстве X^* — линейном пространстве линейных непрерывных функционалов над векторным топологическим пространством (X, τ) . Заметим, что для введения сильной топологии на X^* нам нужно понятие ограниченного множества в X и поэтому, естественно, нужна какая-то топология на векторном пространстве X .

Пусть $B \subset X$ — это произвольное ограниченное множество (см. определение 3) в векторном топологическом пространстве (X, τ) .

Поскольку всякое конечное множество, в частности, точка поглощается всякой окрестностью нуля, то конечное множество — это пример ограниченного множества, однако, естественно, существуют ограничен-

ные множества, не сводящиеся к конечным. Теперь введем следующее семейство полунорм:

$$P_s^\# \stackrel{\text{def}}{=} \{p(f; B); B \subset X\}, \quad (10.8)$$

где

$$p(f; B) := \sup_{x \in B} |\langle f, x \rangle|, \quad B \subset X,$$

где B — это произвольное ограниченное множество в (X, τ) .

Тогда топология порожденная этой системой множеств согласно 7 параграфу, называется *сильной топологией* пространства X^* и обозначается как τ_s^* . Ясно, что поскольку всякое конечное множество — это ограниченное множество, то слабая топология τ_w^* и уж тем более $*$ —слабая топология пространства X^* *слабее* топологии τ_s^* .

Таким образом, сильная топология τ_s является *сильнейшей* топологией на сопряженном пространстве X^* среди указанных «топологизаций».

Полученное локально выпуклое векторное топологическое пространство обозначается как (X_s^*, τ_s^*) . Локально выпуклое векторное топологическое пространство, порожденное $*$ —слабой топологией, обозначается как (X_w^*, τ_w^*) .

§ 11. Нормируемые векторные топологические пространства

Важное свойство ВТП заключается в возможности введения на нем нормы, относительно которой топология нормы совпадает с исходной топологией.

Определение 13. *Векторное топологическое пространство (X, τ) называется нормируемым, если на нем можно ввести такую норму, что топология нормы и исходная топология τ являются эквивалентными.*

Теорема о нормируемости. *Локально выпуклое пространство, содержащее ограниченную окрестность нуля, является банаховым относительно функционала Минковского этой окрестности с топологией, эквивалентной исходной и обратное верно.*

Доказательство.

Шаг 1. Пусть V — есть выпуклая ограниченная окрестность нуля в локально выпуклом векторном топологическом пространстве (X, τ) .

1. Тогда как известно найдется открытая в топологии τ абсолютно выпуклая, окрестность нуля $U \subset V$, которая, естественно, тоже ограничена.

2. Тогда это пространство можно представить в виде

$$X = \bigcup_{\alpha > 0} \alpha U,$$

поскольку множество U является окрестностью нуля и, следовательно, является поглощающим множеством, т. е. для всех $x \in X$ найдется такое $\alpha > 0$, что $x \in \alpha U$.

3. Рассмотрим функционал Минковского множества U :

$$p_U(x) = \inf \{ \lambda : \lambda > 0, x \in \lambda U \}.$$

Поскольку U есть выпуклое, поглощающее и уравновешенное множество (как окрестность нуля), то по теореме 1 функционал Минковского этого множества является полунормой на этом пространстве.

4. Осталось проверить только свойство, что

$$p_U(x) = 0 \Leftrightarrow x = \vartheta.$$

□ Действительно, пусть $x \neq \vartheta$ и $x \notin \lambda_0 U$ при $\lambda_0 > 0$. Такое $\lambda_0 > 0$ существует, поскольку в противном случае $x \in 0 \cdot U = \vartheta$.

Поэтому для всех $\lambda \leq \lambda_0$ в силу ограниченности U оно поглощается окрестностью $\lambda_0 U$

$$x \notin \lambda U \subset \lambda_0 U.$$

Тогда по определению функционала Минковского имеем

$$p_U(x) \geq \lambda_0 > 0. \quad \square$$

Таким образом, $p_U(x)$ есть норма на (X, τ) .

5. Осталось доказать, что $p_U(x)$ порождает ту же топологию на X , что и исходная топология τ . Это есть следствие ранее установленного нами равенства множеств

$$U = \{x \in X : p_U(x) < 1\} \Rightarrow \alpha U = \{x \in X : p_U(x) < \alpha\}.$$

Шаг 2. Обратное утверждение вытекает из того, что

$$U = \{x \in X : \|x\| < 1\}$$

— это ограниченная абсолютно выпуклая окрестность нуля.

Теорема доказана.

§ 12. Строгие индуктивные пределы и полнота

В дальнейшем мы будем рассматривать следующую общую ситуацию — имеется счетное семейство локально выпуклых векторных топологических пространств (X_n, τ_n) таких, что

$$(X_n, \tau_n) \subset (X_{n+1}, \tau_{n+1})$$

и топология τ_{n+1} порождает на X_n исходную топологию τ_n .

Индуктивная топология τ на

$$X \stackrel{\text{def}}{=} \bigcup_{n=1}^{+\infty} X_n,$$

порожденная семейством (X_n, τ_n) , определяется как сильнейшая (т. е. максимальная по включению всех таких топологий) топология τ , для которой все операторы канонического вложения

$$g_n : X_n \rightarrow X$$

непрерывны.

Справедлива следующая теорема:

Теорема 10. *Индуктивная топология τ на каждом из X_n совпадает с τ_n .*

§ 13. Полнота

Дадим определение фундаментальной направленности.

Определение 14. *Фундаментальной направленностью или направленностью Коши называется такая направленность $\{x_\alpha\}_{\alpha \in A}$, что для всякой окрестности нуля U найдется такое $\alpha_0 \in A$, что для всех таких $\alpha_1, \alpha_2 \in A$, для которых $\alpha_0 \leq \alpha_1$ и $\alpha_0 \leq \alpha_2$ имеет место выражение*

$$x_{\alpha_1} - x_{\alpha_2} \in U.$$

Дадим определение полного ВТП.

Определение 15. *Полным ВТП (X, τ) называется пространство, в котором всякая фундаментальная направленность сходится.*

Теперь дадим определение пополнения ВТП.

Определение 16. *Пополнением ВТП (X, τ) называется полное отделимое ВТП $(\hat{X}, \hat{\tau})$, в котором (X, τ) является и топологическим и векторным подпространством, причем*

$$(X, \tau) \stackrel{ds}{\subset} (\hat{X}, \hat{\tau}).$$

Справедлива следующая теорема, которую мы приведем без доказательства.

Теорема 11. *Всякое отделимое ВТП (X, τ) обладает единственным с точностью до изоморфизма пополнением $(\hat{X}, \hat{\tau})$.*

Теорема 12. *Справедливы следующие свойства строгих индуктивных пределов:*

- (i) *Строгий индуктивный предел полных локально выпуклых пространств полон;*
- (ii) *Пусть (X, τ) есть строгий индуктивный предел локально выпуклых пространств (X_n, τ_n) . Множество $B \subset X$ ограничено в (X, τ) тогда и только тогда, когда оно содержится в некотором (X_n, τ_n) и ограничено в нем;*

- (iii) Пусть (X, τ) есть строгий индуктивный предел локально выпуклых пространств (X_n, τ_n) , причем (X_n, τ_n) замкнуто в (X_{n+1}, τ_{n+1}) . Тогда (X, τ) не метризуемо.